

Neporex®

50 SP
Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af fluelarver i stalde, fjerkræhuse, minkfarme og på møddinger.

GENEREL INFORMATION

Neporex er et insektmiddel der virker på fluelarver i f.eks. stalde og fjerkræhuse. Det kan anvendes i stalde med strøelse, i gylle, i fjerkræhuse og andre steder hvor fluelarverne lever. Almindeligvis er 2 behandlinger med 14 dages mellemrum tilstrækkeligt til at stoppe produktionen af fluer effektivt.

Bekæmp flueproblemet inden det opstår.

Anvend Neporex direkte på fluelarverne – enkelt, hurtigt og fluefrit!

BIOLOGISK EFFEKT

Neporex virker ved at hæmme fluelarvernes skeletdannelse, så de dør under væksten. Neporex er effektivt overfor alle typer resistente, danske fluer og har vist, at midlet er lige effektivt overfor dem alle. Neporex er derfor særligt egnet, hvor andre midler og metoder svigter. Da Neporex kun virker i larvestadiet, bruges midlet bedst forebyggende inden der er for mange fluer. Voksne fluer, tilflyvende fluer samt flueproblemer under hurtig udvikling bekæmpes bedst med Agita 10 WG eller Spy.

KALVE- OG KVÆGSTALDE MED DYBSTRØELSE

Fluernes ynglesteder findes i ca. 50 cm brede zoner, langs væggene, ved eller i nærheden af konstruktioner, hvor dybstrøelse ikke kan tramples sammen af dyrene. Kun disse randzoner skal behandles. Det er vigtigt at behandle 1–3 dage efter udrensning, da der skal behandles på gødning. Udrensens boksene ikke, er en 2. behandling nødvendig efter 14 dage og ved stor tilflyvning evt. flere behandlinger.

250 g
FJERKRÆ PÅ NET ELLER I BURE

I fjerkræhold, hvor dyrene holdes på net eller i bur, kan udbringningen foretages ved udsprøjtning. Er gødningslaget mere end 10 cm dybt, gennemføres behandlingen med dobbelt dosering, dvs. 20 g Neporex pr. 10 m², 2. behandling udføres efter 14 dage med normal dosering.

SVINESTALD MED OG UDEN SPALTEGULV

Hele gulvfladen i strøelses- og gødningszonen skal behandles, ligeledes det samlede spaltegulv. Det er vigtigt at behandle helt ud langs kanter og i hjørner. Ved "alt ind – alt ud" systemet kan behandling ske 3–5 dage efter opstaldning.

MINKFARME

Når gødning og halm, der ligger i rækker under burene, er fjernet, udvandes Neporex f.eks. med en vandkande eller ved sprøjtning med stor dyseåbning uden forstøvning. Der behandles i ca. 1 meters bredde i juni og igen i august. Neporex kan også anvendes på møddingen hvis der er tegn på fluelarver eller møddingen ikke er overdækket. Ved stor tilflyvning anbefales at supplere med en Agita 10 WG eller Spy behandling.

BLANDBARHED

Blanding med andre insektmidler er ikke aktuel.

OPBEVARING


Neporex bør opbevares tørt og frostfrit.

BORTSKAFFELSE AFTOM EMBALLAGE


Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

PRODUKTANSVAR


Producenten garanterer for produktets kvalitet, såfremt varen modtages i ubrudt originalpakning. Anbefalinger for produktets anvendelse er ikke bindende, men baseret på producentens seneste erfaringer. Faktorer såsom placering, indeklima, resistens og anvendelsesmetoder

DOSERING OG TIDSPUNKT
Svin



20 g Neporex 50 SP opløses i 15 liter vand til 20 kvm gødningsareal.




20 g Neporex 50 SP opløses i 5 liter vand til 20 kvm gødningsareal.

Kalve, kvæg og fjerkræ


20 g Neporex opløses i 15 liter vand til 20 kvm gødningsareal.



20 g Neporex opløses i 5 liter vand til 20 kvm gødningsareal.

Mink


40 g Neporex opløses i 10 liter vand til 20 kvm gødningsareal.

1. Behandling: Når de første fluer viser sig.
2. Behandling: Ca. 14 dage senere.
3. Behandling: Forebyggende behandling hver anden måned.

1. Behandling: Ca. 2 dage efter opstaldning eller udmugning.
2. Behandling: Ca. 14 dage senere.

1. Behandling: Ca. 2 dage efter udrensning i juni måned.
2. Behandling: I august måned.

Se afsnittet om MINKFARME.

kan påvirke produktets effekt. Novartis Healthcare A/S påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller u hensigtsmæssig anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Novartis Healthcare A/S ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og lignende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

® = Reg. varemærke for Novartis Animal Health Inc. Basel, Schweiz

Novartis Healthcare A/S
Sektor Animal Health
Lyngbyvej 172, 2100 København Ø,
tlf. 39 16 84 00